

HEPATYL®



Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 24-02-2020

Informations et posologie

Espèces cibles



Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens et les chats :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé comme draineur hépatique.

Administration

Voie d'administration



Posologie

10 gouttes pour les animaux de moins de 10 kg et 10 gouttes par tranche de 10 kg de poids corporel une fois par jour pendant 3 semaines.

Administrer directement dans la bouche de l'animal, ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un mL contient :

Taraxacum dens leonis 3 DH

Chelidonium majus 5 CH

Carduus marianus 3 CH

Cynara scolymus 3 DH

Hydrastis canadensis 3 CH

Lycopodium clavatum 5 CH

China 3 DH

Solidago virga aurea 3 CH

Berberis vulgaris 3 CH

Sulfur 7 CH aa

Excipient :

Ethanol à 15% V/V.

Forme pharmaceutique

Solution

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Médicament vétérinaire non soumis à prescription.

Temps d'attente

Propriétés

Propriétés pharmacologiques

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Non connues.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Aucune.

Autres précautions

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Non connues.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 5 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Classification ATC Vet

- QV03AX

Laboratoire



BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE
Tél. : 04.78.45.61.00
Fax. : 04.78.45.61.02
<http://www.boiron.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/1919091 6/2008

Date de première autorisation

2008-11-06

Présentation et quantité

HEPATYL® Boîte de 1 flacon de 30 mL et de 1 pipette graduée
Code GTIN : 03352712006496