

EPILEPTYL®



Date de création : 08-11-2017

Date de mise à jour : 24-02-2020

Informations et posologie

Espèces cibles



Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles

Chez les chiens et les chats :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles d'origine épileptique.

Administration

Voie d'administration



Posologie

20 gouttes par tranche de 20 kg de poids corporel, deux fois par jour.

La durée du traitement est de plusieurs mois soit en continu, soit par cures de 15 jours par mois.

Administrer directement dans la bouche de l'animal ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment.

Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires

Un mL contient :

Crésol 5, 7, 9 CH

Cicuta virosa 15 CH

Veratrum viride 5 CH

Coriaria myrtifolia 12 CH

Ænanthe crocata 9 CH

Rana bufo 12 CH

Cuprum metallicum 9 CH

Calcarea arsenicosa 15 CH aa

Excipient :

Ethanol à 15 % V/V.

Forme pharmaceutique

Solution

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance

Médicament vétérinaire non soumis à prescription.

Temps d'attente

Propriétés

Propriétés pharmacologiques

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Mise en garde

Contres-indications et mise en garde

Contre-indications

Aucune.

Mises en gardes particulières à chaque espèce cible

Toutes cibles :

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité)

Non connus.

Précautions d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Sans objet.

Autres précautions

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Utilisation en cas de grossesse et de lactation ou de ponte

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes)

Non connu.

Précautions pharmacologiques

Interactions médicamenteuses et autres

Non connues.

Incompatibilités

Non connues.

Conservation

Durée de conservation

5 ans.

Après ouverture : 12 mois.

Précautions particulières de conservation selon pertinence

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Présentation

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Classification ATC Vet

- QV03AX

Laboratoire



BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE
Tél. : 04.78.45.61.00
Fax. : 04.78.45.61.02
<http://www.boiron.fr>

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

FR/V/4516876 7/2008

Date de première autorisation

2008-11-06

Présentation et quantité

EPILEPTYL® Boîte de 1 flacon de 30 mL et de 1 pipette graduée
Code GTIN : 03352712006410